



Limanowa, dnia 21 grudnia 2016 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w LIMANOWEJ

Jerzy Joniec

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Limanowej

Nasz znak: PIW.60408/07/12/16

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej przekazuje informację dotyczącą wystąpienia ośmiu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI podtyp H5N8 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 20.12.2016 roku w tym stwierdzono pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie przyzagrodowym liczącym ok. 20 sztuk drobiu (kur i indyków) w Gminie Książ Wielki, powiat miechowski, województwo małopolskie.

W załączeniu przekazuje również ulotkę informacyjną dotyczącą w/w jednostki chorobowej dla hodowców drobiu.

Powyższe informację proszę przekazać drogą zwyczajowo przyjętą.

POWIATOWY
LEKARZ WETERYNARII
w Limanowej

lek. wet. Jerzy Joniec



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Br. Czecha 6, 34-600 Limanowa
tel./fax:(18)337-17-61, e-mail: piwlim@poczta.onet.pl, www.piw-imanowa.pl

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).



Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;**
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;**
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;**
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób**

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dziwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.